

3. Можно читать, смотреть телевизор и пр.
4. Не поднимайте тяжести более 5 кг в течение 1 месяца.
5. Избегайте резких наклонов вниз, падений, ударов.
6. Не подвергайте организм резким температурным перепадам в течение 1 месяца.

Необходимо капать капли в оперированный глаз по следующей инструкции:

1. Пилоксидин 0,5мг (Бактавит) по 1 капле 3 раза в день 14 дней.
2. Бромфенак 0,09% (Броксинак) по 1 капле 2 раза в день 1 месяц.

Нормальное зрение



Возрастная
макулодистрофия



Апрель, 2023 г.
АО "Якутская республиканская типография
имени Ю.А. Гагарина"



ЯКУТСКАЯ РЕСПУБЛИКАНСКАЯ
ОФТАЛМОЛОГИЧЕСКАЯ
КЛИНИЧЕСКАЯ БОЛЬНИЦА



ГОД ТРУДА
в Республике Саха (Якутия)
2023

СОВЕТЫ доктора Луцкана

ВОЗРАСТНАЯ МАКУЛЯРНАЯ ДЕГЕНЕРАЦИЯ



Сохраните
на заметку

Дорогие друзья!

«Возраст выдают глаза» - говорят в народе. На что следует обратить внимание, какие изменения глаз называются возрастными? Всё описано в этом буклете, пожалуйста, сохраните памятку себе. Загляните в мой телеграм или ВКонтакте, если появятся другие вопросы по глазам, свои соцсети я веду лично, буду рад ответить.



ВКонтакте



Телеграм



Советы доктора
Луцкана в эл.
варианте



Возрастная макулярная дегенерация - это заболевание, при котором происходит образование патологических кровеносных сосудов в глазу. Стенка этих слабых незрелых сосудов способна пропускать жидкость.

Макула - это участок сетчатки, отвечающий за четкое центральное зрение. Повышенная проницаемость сосудов и накопление жидкости в зоне макулы могут привести к ухудшению и размытости центрального зрения и, с течением времени, к образованию рубцов.

Виды ВМД: сухая, влажная

Подобно царапинам на фотографии, эти рубцы мешают вам видеть всё, что вам нужно.

Влажная форма



Сухая форма

Факторы: возраст, семейный анамнез, высокие уровни артериального давления и холестерина в крови, курение, избыточный вес. Отказ от курения значительно снижает риск поражения глаз.

Лечение: наблюдение, прием антиоксидантных витаминных и минеральных добавок, интравитреальные инъекции (в стекловидное тело) препаратов (Луцентис, Эйлеа, Визкью), ингибирующих (угнетающих, подавляющих) выработку эндотелиального сосудистого фактора роста (VEGF).

Чтобы послеоперационный период прошел без осложнений и в кратчайшие сроки необходимо придерживаться следующих правил:

1. Не трите оперированный глаз руками и не нажимайте на него.
2. Не допускайте попадания в оперированный глаз сырой воды, мойте голову наклонив назад.